

## Discussion (III)

---

*Diskussionsbeitrag* von Pfarrer **E. Anderegg**, Steinengraben 71, 4000 Basel (wird an anderer Stelle publiziert).

### **Pathogénie, pathodynamique, éléments de prophylaxie de la tentative de suicide juvénile**

*C. L. Cazzullo, D. De Martis, L. Balestri*

Les auteurs soulignent d'abord les différences entre la tentative de suicide des jeunes par rapport à ce que l'on peut observer chez les adultes ou chez les vieux : à savoir le prévaloir dans la conduite juvénile de gestes à type « court-circuit » ; tandis que chez l'adulte on peut plutôt parler de suicide manqué.

En se fondant sur un échantillon des 100 cas observés dans le Service de Psychiatrie d'Urgence de la Clinique Psychiatrique de Milan ils étudient le rôle des facteurs intrinsèques et extrinsèques, ceux derniers d'ordre familial et social. Ils envisagent les types prévalents des personnalités et les modalités d'étude que l'on suit aux buts d'une intervention thérapeutique et prophylactique (examens psychiatriques et biologiques, questionnaires, test mentaux, enquêtes sociales etc.). Pour ce qui tient à la pathodynamique de la tentative de suicide ils considèrent ces trois thèmes fonciers : 1. la tentative de suicide comme fuite d'une réalité ressentie comme frustrante ; 2. comme instrument hétéro-agressif ayant une valeur de captation et de chantage ; 3. comme mécanisme plus clairement mélancholique.

Après avoir souligné les difficultés d'une prophylaxie de la tentative de suicide juvénile, ils exposent les critères méthodologiques et les expériences conduites auprès des centres prophylactiques. Ils insistent sur quelques points essentiels tels que le premier rencontre avec le malade, l'instauration d'un rapport valable, la nécessité de maintenir et de renforcer les faibles liens qui ont été constitués pendant la période d'hospitalisation, par un travail psychosocial de longue durée.

Les auteurs concluent leur intervention en exposant l'organisation prophylactique de Milan dans les deux secteurs : de la neuropsychiatrie infantine et de la psychiatrie.

Adresse de l'auteur : Prof. *Carlo L. Cazzullo*, Clinica Psichiatrica, Università degli Studi di Milano, Milano-Affori, Via Privata G. F. Besta, 1.

### **Éléments pour une prophylaxie sociale des conduites suicidaires du jeune adulte**

*L. Crocq*

L'accroissement du nombre des tentatives de suicide de l'adulte jeune est un phénomène psychopathologique social. Il ne peut être complètement étudié par la seule méthode clinique, mais doit être exploré aussi dans ses dimensions collectives et sociologiques. L'unité d'étude la plus petite est le nombre total de cas survenus dans un secteur social